

Підтримувач(и):

\* Рослина куляста, середньощільна, помірної сили росту. Листок зелений, помірно блискучий. Пухирчастість від слабкої до помірної. Центральна частка листка з тупою основою, зубчаста по краю. Волоски черешка злегка відхилені. Прилисток зі слабким антоціановим забарвленням. Утворює середню кількість слабо опушених вусів з антоціановим забарвленням від слабкого до помірного. Суцвіття розташоване вище листків. Квітка середнього розміру, пелюстки перекриваються. Чашечка більша за віночок. Плід середнього розміру, червоний, помірно блискучий, переважно конічний. Зона вільна від зерняток мала. Нерівності на поверхні сильні. Чашечка розташована на рівні плоду. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зернятка розташовані врівень з плодом. М'якоть дуже тверда, світло-червона. Повітряна порожнина середнього розміру. Рослина цвіте і досягає в середньопізні строки. Плодоношення не повторює.

За даними заявника середній врожай з куща становить 900 г. Маса ягоди: середня – 22, максимальна – 24 г. Зимо- і посухостійкість середні. Стійкість проти хвороб висока. Стійкість проти суничного кліща середня. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 9,0 балів, транспортабельність дуже висока. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона: Лісостеп.

\* Дані заявника.

## Горіх грецький

### 08075002 Костюженский

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(и):

\* Дерево сильноросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (на периферії дерева). Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть багато. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкояйцевидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа його клиновидна, верхівка - зрізана. Апікальний кінчик досить помітний. "Сідельце" дуже помітне, середньої ширини, розташоване у верхній 2/3 шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві глибока. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, легко видаляється. Основний колір його світлий. Час досягання - між середнім і пізнім, листопаду - ранній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються дуже рано. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 24 т/га. Маса ядра: середня - 14,5, максимальна - 17,2 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,7 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075001 Коржеуцкий

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(и):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, еліптичний - у поздовжньому перерізі через

шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - еліптичний. Коефіцієнт округлості горіха низький. Основа та верхівка округлі. "Сідельце" слабо помітне, середньої ширини, розташоване у верхній половині шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро велике, видаляється дуже легко. Основний колір його дуже світлий. Час досягання і листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються рано. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 24 т/га. Маса ядра: середня - 10,0, максимальна - 12,3 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами дуже висока, проти пошкодження шкідниками - висока. Виповненість горіха становить 8,2 балів. Група досягання рання. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075006 Кишиневский

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево слаборосле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, широкояцевидний - у поздовжньому перерізі через шов і перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха низький. Основа клиновидна, верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване у верхній 2/3 шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані досить міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір його світлий. Час досягання і листопаду - пізній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються пізно. Чоловічі квітки цвітуть одночасно з жіночими.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 22 т/га. Маса ядра: середня - 10,0, максимальна - 16,2 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,2 балів. Група досягання пізня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075003 Кодрене

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, розлоге. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки широкоеліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, широкояцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа округла, верхівка загострена. Апікальний кінчик слабо помітний. "Сідельце" слабо помітне, середньої ширини, розташоване у верхній половині шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро велике, видаляється дуже легко. Основний колір його помірно світлий. Час досягання і листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються рано. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 35 т/га. Маса ядра: середня - 13,3, максимальна - 14,0 г. Зимо- і