

шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - еліптичний. Коефіцієнт округлості горіха низький. Основа та верхівка округлі. "Сідельце" слабо помітне, середньої ширини, розташоване у верхній половині шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро велике, видаляється дуже легко. Основний колір його дуже світлий. Час досягання і листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються рано. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 24 т/га. Маса ядра: середня - 10,0, максимальна - 12,3 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами дуже висока, проти пошкодження шкідниками - висока. Виповненість горіха становить 8,2 балів. Група досягання рання. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

08075006 Кишиневский

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево слаборосле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, широкояцевидний - у поздовжньому перерізі через шов і перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха низький. Основа клиновидна, верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване у верхній 2/3 шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані досить міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір його світлий. Час досягання і листопаду - пізній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються пізно. Чоловічі квітки цвітуть одночасно з жіночими.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 22 т/га. Маса ядра: середня - 10,0, максимальна - 16,2 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,2 балів. Група досягання пізня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

08075003 Кодрене

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево середньоросле, розлоге. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки широкоеліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, широкояцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа округла, верхівка загострена. Апікальний кінчик слабо помітний. "Сідельце" слабо помітне, середньої ширини, розташоване у верхній половині шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро велике, видаляється дуже легко. Основний колір його помірно світлий. Час досягання і листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються рано. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 35 т/га. Маса ядра: середня - 13,3, максимальна - 14,0 г. Зимо- і