

посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,5 балів. Група достигання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### **08075005 Калашарский**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках однорічних пагонів (по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкояйцевидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа клиновидна, верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані помірно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється дуже легко. Основний колір його дуже світлий. Час достигання і листопаду - ранній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються між раннім і середнім строками. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 22 т/га. Маса ядра: середня - 16,4, максимальна - 22,0 г. Зимостійкість становить 7 балів, посухостійкість - 8. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками - 8 балів. Виповненість горіха становить 8,2 балів. Група достигання рання. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### **08075004 Лунгуце**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів. Однорічний пагін зелено-коричневий. Бічні листочки вузькоеліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов і перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - стиснутий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа клиновидна, верхівка - округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір його світлий. Час достигання і листопаду - ранній. Листя не обпадає. Оплідень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються між раннім і середнім строками. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 30 т/га. Маса ядра: середня - 11,1, максимальна - 12,0 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками 8,5 балів. Виповненість горіха від високої до дуже високої. Група достигання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### **08075007 Скиносский**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"