

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення на периферії). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкояйцевидна - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа клиновидна, верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані досить міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видалається дуже легко. Основний колір його дуже світлий. Час досягання і листопаду - ранній. Листя не опадає. Оплідень опадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються між раннім і середнім строком. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 25 т/га. Маса ядра: середня - 13,5, максимальна - 17,2 г. Зимостійкість 8, посухостійкість - 8,2 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками - дуже висока. Виповненість горіха становить 8,3 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

08075009 Фернет

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево середньоросле, напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, круглий - у поздовжньому перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха високий. Основа клиновидна, верхівка зрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з рельєфною поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро середнього розміру, видалається легко. Основний колір його світлий. Час досягання між середнім і пізнім строком, листопаду - середній. Листя не опадає. Оплідень опадає. Вегетативні бруньки розпускаються пізно. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 8 x 8 м середня врожайність становить 32-40 т/га. Маса ядра: середня - 11,0, максимальна - 12,5 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,1 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

08075010 Фернор

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Дерево середньоросле, напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, круглий - у поздовжньому перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха високий. Основа клиновидна, верхівка зрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка