

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення на периферії). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх середнього розміру, яйцевидний - у поздовжньому перерізі через шов, широкояйцевидна - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній. Основа клиновидна, верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинки з'єднані досить міцно, перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видалається дуже легко. Основний колір його дуже світлий. Час досягання і листопаду - ранній. Листя не опадає. Оплідень опадає частково. Вегетативні бруньки розпускаються між раннім і середнім строком. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 10 x 10 м середня врожайність становить 25 т/га. Маса ядра: середня - 13,5, максимальна - 17,2 г. Зимостійкість 8, посухостійкість - 8,2 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками - дуже висока. Виповненість горіха становить 8,3 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075009 Фернет

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, круглий - у поздовжньому перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха високий. Основа клиновидна, верхівка зрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з рельєфною поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро середнього розміру, видалається легко. Основний колір його світлий. Час досягання між середнім і пізнім строком, листопаду - середній. Листя не опадає. Оплідень опадає. Вегетативні бруньки розпускаються пізно. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 8 x 8 м середня врожайність становить 32-40 т/га. Маса ядра: середня - 11,0, максимальна - 12,5 г. Зимо- і посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8,1 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075010 Фернор

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, круглий - у поздовжньому перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха високий. Основа клиновидна, верхівка зрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка

вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з рельєфною поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір його світлий. Час досягання між середнім і пізнім строком, листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає. Вегетативні бруньки розпускаються пізно. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 8 x 8 м середня врожайність становить 45-50 т/га. Маса ядра: середня - 11,0, максимальна - 13,0 г. Зимостійкість 9, посухостійкість - 8 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідками висока і дуже висока. Виповненість горіха становить 8 балів. Група досягання пізня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

### 08075008 Фержан

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по периферії дерева). Однорічний пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середня кількість. Горіх дрібний, круглий - у поздовжньому перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха високий. Основа клиновидна, верхівка зрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Борідка вздовж "сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з рельєфною поверхнею. Половинки з'єднані міцно, перетинки тонкі. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір його світлий. Час досягання між середнім і пізнім строком, листопаду - середній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає. Вегетативні бруньки розпускаються між середнім і пізнім строком. Чоловічі квітки цвітуть раніше за жіночі.

За даними заявника за схеми садіння 8 x 8 м середня врожайність становить 40-50 т/га. Маса ядра: середня - 11,0, максимальна - 12,0 г. Зимостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненість горіха становить 8 балів. Група досягання середня. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

\* Дані заявника.

## Інші Шовковиця

### 05206003 Мереживо

Заявник: Донецький ботанічний сад Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

\* Дерево середньоросле, розлоге. Однорічний пагін сіруватий із середньою кількістю сочевичок, не опушений. Брунька середнього розміру. Цвіте у середні строки. Суцвіття середнього розміру. Листок середнього розміру, цілісний, із серцевидною основою, по краю зубчастий. Зубці середнього розміру. Плодоніжка середньої довжини. Супліддя велике, еліптичне, симетричне, біле, солодке, м'яке. Час досягання середній.

За даними заявника за схеми садіння 6 x 6 м середня врожайність становить 300 ц/га, середній урожай з дерева 38,9 кг. Маса плоду: середня - 3,69, максимальна - 4,15 г. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 9 балів. Транспортабельність середня. Сорт середньостиглий. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.