

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,8 ц/га, потенційна – 40,9 ц/га. Вміст жиру – 49,1%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 3,9%, іржею – 11,3%, білою гниллю – 15,2%). Стійкий до вилягання та осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-206. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Сходи зелені, без антоціану. Стебло заввишки до 150 см, середньоопушене, добре облиственене. Листки середнього розміру, темно-зелені, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин – 49г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 117 днів. Середня урожайність за роки випробування – 25,5 ц/га, потенційна – 40,2 ц/га. Вміст жиру – 50,3%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 6,4%; іржею – 13,4%; гнилями: білою – 9,4%, сірою – 32,3%). Стійкий до вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-306. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Стебло заввишки до 135 см, середньоопушене, прямостояче, однокошикове. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні, зелені з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, ледь опуклий. Сім'янки чорні, панцирні. Маса 1000 насінин – 59г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 24,9 ц/га, потенційна – 38,4 ц/га. Вміст жиру – 51,5%. Стійкий до посухи, осипання, вилягання. Ураження хворобами середнє (вовчком – 8,7%; іржею – 23,6%; гнилями: білою – 13,3%, сірою – 39,9%).

Рекомендований для зони Степу.

Дністр. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).

Стебло прямостояче, негіллясте, середньоопушене в верхній частині, заввишки до 206 см.

Листки зелені, великі, з горбкуватою поверхнею. Кошик великий (18-20 см), ледь опуклий, середньої товщини. Сім'янки чорні, панцирні, маса 1000 насінин – 57г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 128 днів. Середня урожайність в умовах Степу – 26,9 ц/га, Лісостепу – 28 ц/га, потенційна – 41,2 ц/га. Вміст жиру – 50,6%. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами (вовчком – 1,6%; іржею – 10,2%; гнилями: білою – 7-14,8, сірою – 22-26%) Толерантний до фомопсису. Оптимальна густина стояння перед збиранням – 50 тис. на гектар.

Рекомендований для зон Лісостепу та Степу.