

Рекомендована густина стояння перед збиранням – 65 тис/га.  
Рекомендований для зони Лісостепу.

**Українське сонечко.** Заявник – ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)”.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене. Облиственість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик напівповернений донизу, малий, плесканий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 52,0г, натура 415 г/л.

Веgetаційний період 109 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,5 ц/га. Вміст жиру – 49,8%, білку – 17,0%, лушпинність – 24%.

Стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Лісостепу.

**Ковчег.** Заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Трьохлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабкоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні, зелені, середнього розміру. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Зубчастість регулярна, середня; форма поперечного розміру опукла, кут розходження бічних гілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгортки невелика. Форма листочків обгортки округла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті жовті без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура – 443 г/л.

Веgetаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 26,1 ц/га, максимальна 39,6 ц/га. Вміст жиру 49,8%, білку – 18,2%, лушпинність 24%.

Гібрид стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Стійкий до вилягання, посухи, середньо стійкий до осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

**Балкан.** Заявник – Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Сербія).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.