

Артеміда. Заявники - Інститут кормів УААН, Красноградська дослідна станція.

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із сорту Красноградська 86.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - абенарія.

Стебло зелене, з білим і рідким опушенням і верхівкою висотою 78-90 см, що в'ється. Суцвіття - китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, фіолетова. Біб світло-пісочний, зігнутий, на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2, 6, максимальна -- 4. Насінина овальна, середнього розміру, жовта. Рубчик світло-коричневий, середнього розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 132,5 г.

Вегетаційний період в зоні Степу 111,3 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 24,7 ц/га. Вміст сирого протеїну 39,7%, вміст жиру 22,2%. Стійкий до хвороб.

Рекомендований для зони Степу.

Анатоліївна. Заявники – Інститут кормів УААН, Кіровоградське НВО «Еліта».

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із гібридної комбінації Кіровоградська 5 + (Фіскебі+Харсой).

Підвид – маньчжурський, апробаційна група – латіфолія.

Форма рослин розлога, стебло зелене з рідким рудим опушенням, тип росту детермінантний, середня висота 90-110 см. Суцвіття – китиця, 8-12 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, біла. Біб рудий, опуклий. На кінці з дзьобиком, кількість насінин у бобі в середньому 2,9, максимальна – 4. Насіння овальне, середнього розміру, жовте з чорною пігментацією. Рубчик чорний, середнього розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 146 г.

Вегетаційний період у зоні Степу – 121,4 дня, середня урожайність за роки випробування у зоні Степу 19,8 ц/га. Вміст протеїну 33,2%, вміст жиру 25,1%.

Рекомендований для зони Степу.

Оксана. Заявники - Інститут кормів УААН, Інститут зрошуваного землеробства УААН.

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із гібридної комбінації Вілкін + Білосніжка.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - цінерада.

Форма рослин компактна, стебло зелене з рудим і рідким опушенням, висотою 150-165 см. Суцвіття-китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, біла. Біб рудий, опуклий, на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 3,5, максимальна – 4. Насінина середнього розміру округлої форми, жовте з чорно-коричневою пігментацією. Рубчик чорний з вічком, середній, овальної форми. Маса 1000 насінин 138,9 г.

Вегетаційний період в зоні Степу --120,6 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу (на зрошенні) –18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 37,6%, вміст жиру 21,4%.

Рекомендований для зони Степу.