

Прикарпатська 96. Заявники - Івано-Франківська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів УААН.

Сорт створений шляхом індивідуально відбору із сорту Мейпл Ероу.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - віріда.

Форма рослин напіврозлога, стебло зелене з жовто-бурим опушенням, висотою 70-85 см. Тип росту детермінантний. Суцвіття - китиця, 2-5 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, фіолетова. Біб рудий, плоский на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2,3, максимальна - 3. Насінина дрібна, овальної форми, жовта. Рубчик жовто-зелений, лінійний, середнього розміру. Маса 1000 насінин 138,9 г.

Вегетаційний період в зоні Степу -109,7 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу - 17,8 ц/га, у зоні Степу - 16,9 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,4%, вміст жиру 23,0%.

Рекомендований для зони Степу.

Київська 98. Заявник - Інститут землеробства УААН. Підвид маньчжурський, апробаційна група - сордіда.

Форма рослини проміжна, стебло зелене з рудим опушенням, прямим закінченням, висотою 85-95 см. Суцвіття - китиця, 12-13 квіток на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб темно-коричневий, слабо зігнутий, з загостреною верхівкою, кількість насінин у бобі в середньому 2-2,5, максимальна - 4. Насінина овальна, жовта, без пігментації, середнього розміру. Рубчик овально-подовжений, коричневий. Маса 1000 насінин - 160г.

Тип росту напівдетермінантний, малогіллястий.

Вегетаційний період (від входів до господарської стиглості) в зоні Полісся 121,9 днів, Лісостепу 113,0 днів, середня урожайність за роки випробування у зоні Полісся 17,6 ц/га, у зоні Лісостепу - 17,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,6-36,8%, вміст жиру 21,8-22,0%.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

Подільська 416. Заявники Інститут агроєкології та біотехнології УААН, Подільська державна аграрно-технічна академія, Інститут кормів УААН.

Апробаційна група сордіда.

Форма рослини компактна, стебло зелене з рудим опушенням, проміжним типом верхівки, висотою 80-100 см. Суцвіття китиця, 8-12 квіток на квітконіжці. Квітка середнього розміру, фіолетова. Біб темно-коричневий, слабозігнутий, кількість насінин у бобі в середньому 2,25, максимальна - 4. Насінина овальна або округла, жовта, без пігментації, рідко з коричневою пігментацією. Рубчик коричневий, середньої величини, овальної форми. Маса 1000 насінин 148г.

Вегетаційний період (від сходів до господарської стиглості) 107,2-116,2 днів, середня урожайність за роки випробування 20,3-26,4 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,4-37,4%, жиру 22,2-23,2%.

Рекомендований для зони Лісостепу.