

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 107см. Рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок малого розміру з боковими листочками овальної форми, зелений.

Квітка фіолетова. Біб темно-коричневий. Насінина середнього розміру, кулясто-приплюснutoї форми, зелено-жовтого забарвлення. Рубчик жовтого забарвлення.

Вегетаційний період 128 - 136 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 19,1 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,3 - 36,0%, вміст жиру 22,2 - 23,3%. Маса 1000 насінин 160г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

### **Спринт.** Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створени індивідуальним добором з гібридної популяції другого покоління Кубань х Волна.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота рослини до 80 см, рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок середнього розміру з боковими листочками овальної форми, темно-зелений.

Квітка біла. Біб коричневий. Насінина малого розміру, кулясто-приплюснutoї форми, жовтого забарвлення. Рубчик коричневого забарвлення.

Вегетаційний період 112 - 121 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 15,6 ц/га, в зоні Лісостепу 18,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6 - 36,7%, вміст жиру 22,7 - 23,5%. Маса 1000 насінин 140г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

### **Срібна.** Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створено індивідуальним добором з гібридної популяції Високоросла 3 х Ходсон.

Форма рослини широка, стебло зелене з світло-коричневим опушенням і прямим закінченням, середньооблиственне. Висота рослин до 90 см. Листочки трійчасті овально - загострені, цільнокраї. Кінчик листка загострений. Суцвіття - китиця середньої довжини, забарвлення квітконоса зелене. Квітка біла, дрібна. Біб широкий, середньої виповненості, слабо зігнутий із загостреним кінчиком. У бобі в середньому 2-3 насінини, максимально 4. Насінина велика, овальної форми, жовтого забарвлення, без пігментації. Рубчик коричневого забарвлення.

Вегетаційний період 131 - 140 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 18,4 ц/га, в зоні Лісостепу 18,2 ц/га. Вміст сирого протеїну 30,7 - 39,1%, вміст жиру 21,2 - 23,0%. Вміст в насінні інгібітора трипсину 19,1 мг/г. Маса 1000 насінин 190г.

Сорт відрізняється стійкістю до розтріскування бобів, до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.