

Валентія. Заявники: Інститут фізіології рослин і генетики УААН, Інститут землеробства УААН, Селекційне - генетичний інститут УААН.

Сорт створено методом багаторазового індивідуального відбору з гібриду Київська 27 х Київська скоростигла.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний. Рослини заввишки до 80 см. з рудувате -коричневим забарвленням волосків. Листочок середнього розміру, зелений, бокові листочки овальної форми. Квітка фіолетова. Біб коричневий. Висота прикріплення нижнього бобу 13,8 см.

Вегетаційний період 122-130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 20,2 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,5 - 35,8%, вміст жиру 23,5 - 25,0%. Маса 1000 насінин 180г.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами незначне. Сорт відрізняється високою симбіотичною активністю комплексу з бульбочковими бактеріями.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Васильківська. Заявники: Інститут фізіології рослин і генетики УААН, Інститут землеробства УААН, Селекційно - генетичний інститут УААН.

Сорт створений методом багаторазового індивідуального відбору з гібриду Київська 27 х Київська скоростигла.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 90 см. Листочки середнього розміру, зелені, бокові листочки овальної форми. Квітка фіолетова. Біб коричневий, серповидний. Висота прикріплення нижнього бобу 14,6 - 17,7 см. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовте. Рубчик темно - коричневий.

Вегетаційний період 120 -136 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 18,2 ц/га, в зоні Лісостепу 22,0 ц/га, в зоні Полісся 20,3 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6 - 36,6%, вміст жиру 22,9 - 23,9%. Маса 1000 насінин 170 г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання; середньостійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

Офелія. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт виведений індивідуальним відбором у гібридній популяції другого покоління Аванс х л. 88 - 407.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний, рослини заввишки 85 см. з сірим забарвленням волосків. Листочок середнього розміру, зелений. Бокові листочки овальної форми. Квітка біла. Біб коричневий. Висота прикріплення нижнього бобу 16,3 см. Насінина середнього розміру, кулястої форми, жовта. Рубчик жовтого забарвлення.

Вегетаційний період 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 20,1 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6%, вміст жиру 21,6%. Маса 1000 насінин 145 г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання; середньостійкий до посухи. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Степу.