

## РЕДЬКА ОЛІЙНА

**Журавка.** Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Сходи зелені. Кущ нещільний. Листки світло-зелені, перисто-надрізані, опушені, з зморшкуватою поверхнею. Антоціанове забарвлення відсутнє.

Суцвіття - китиця з білими, рожевими та фіолетовими квітками. Стручок циліндричної форми з гострим кінчиком, не розтріскується. На одній рослині до 150 стручків.

Середня урожайність за роки випробування 14,8-16,4 ц/га, вміст жиру – 37,4%, білка – 27,2%.

Сорт стійкий до посухи та осипання, середньостійкий до вилягання.

Ураження хворобами середнє (бактеріоз 11,5%, пероноспороз – 3,5%).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу як олійний і кормовий.

## ГІРЧИЦЯ САРЕПТСЬКА

**Тавричанка 5.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сходи зелені. Кущ напівзімкнутий, заввишки до 122 см. Листки: нижні черешкові, ліровидно-перистонадрізані; верхні – сидячі, видовжено-лінійні. Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Стручок тонкий, продовгуватий з шилоподібним носиком. Насіння жовте, кулеподібне.

За роки випробування середня урожайність сорту становила від 10 до 16,3 ц/га, вміст жиру – 40,9%, білка – 24,0%. Сорт стійкий до вилягання і посухи, середньостійкий до осипання. Ураження хворобами середнє (бактеріозом – 22%, пероноспорозом – 5,5%).

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся як харчовий і олійний.

**Мрія.** Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 116 см, кущ напівзімкнутий. Стебло неопушене, діаметром 7-8мм. Листки світло-зелені, непарноперистонадрізані. Суцвіття китицеподібне з яскраво-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, неопушений, з округлим носиком і бугорчастою поверхнею. Насіння жовте, овально-округле.

Середня урожайність за роки випробування від 8,9 до 16 ц/га. Вміст жиру 39,6%, білка – 26,1%. Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи.

Ураження хворобами нижче середнього (бактеріозом – 9,5%, пероноспорозом – 6,3%).

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу як олійний.