

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Айсберг. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Південна ніч. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.