

Плід – округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим і злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке, блискуче, слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин 7,9г.

Вегетаційний період 84 дні. Середня урожайність 16,7 ц/га. Вміст жиру 44,8%, вихід олії з гектара 748 кг.

Сорт стійкий до осипання, посухи, вилягання.

Рекомендований для зони Степу.

КУНЖУТ

Надія. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 100 см, зелене, галузиться. Розміщення листків на стеблі почергове. Листки зелені, черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх – розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно обслистнене.

Квітка світло-фіолетова. Плід – коробочка з добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середня вага насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин 3,2 г., натура 609.

Вегетаційний період до 96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру 54,9%.

Сорт світлолюбивий, стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості ґрунту, не виносить важких ґрунтів. Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендується для зон Степу та Лісостепу для отримання рослинної високоолеїнової олії.

СУРІПИЦЯ ЯРА

Горянка. Заявник – Інститут хрестоцвітих культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.

Кущ напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5, висота прикріплення нижніх гілок 15-20 см. Листки ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковим нальотом, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Насіння світло-коричнево-жовте, округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин 2,3 г.

Вегетаційний період 86 днів. Середня урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 40%, ерукової кислоти 0,6%, глюкозинолатів 0,5%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухи та осипання.

Рекомендована норма висіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив $N_{90}P_{60}K_{120}$.

Посів у першій декаді квітня.

Рекомендований для зони Полісся для виробництва рослинної олії.