

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012040 Назва сорту: МІП Ювілейна Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 1589

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191187

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1  | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                   | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)   | прямий                   | 1   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                      | відсутня або дуже мала   | 1   |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | ранній                   | 3   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | сильний                  | 7   |
| 7  | Колос: восковий наліт   | сильний                  | 7   |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | сильний                  | 7   |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | середня                  | 5   |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена         | 3   |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | циліндрична              | 2   |
| 12 | Колос: за щільністю   | середній                 | 5   |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | середній                 | 5   |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | наявні зубці             | 2   |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | короткі                  | 3   |
| 16 | Колос: забарвлення  | біле або солом'яно-жовте | 1   |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)  | відсутнє або дуже вузьке | 1   |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                               | скошене                  | 1   |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | дуже короткий            | 1   |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | прямий                   | 1   |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою                                | прямий                   | 1   |
| 24 | Зернівка: забарвлення   | червоне                  | 2   |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | помірне                  | 5   |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                   | 1   |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | середня                  | 5   |
| 28 | Зернівка: за шириною  | середня                  | 5   |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина                                 | велике                   | 7   |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | крупна                   | 7   |
| 31 | Язичок: виявлення   | короткий                 | 3   |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль   | відсутній                | 1   |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                   | 2   |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овальна                  | 2   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,11     | 6,49 | 5,76 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 3,93     | 7,1  | 6,23 |
| +/- до усередненої урожайності, т/га  | -1,18    | 0,61 | 0,47 |
| +/- до усередненої урожайності, %   | -23,1    | 9,4  | 8,2  |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,06     | 0,06 | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 259      | 266  | 263  |
| Висота рослини, см  | 82,4     | 89,1 | 94,2 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 40,2     | 44,1 | 42,1 |
| Вміст білка, %  | 13,8     | 14,1 | 13,5 |
| Вміст сирової клейковини, %   | 27,6     | 28,3 | 26,9 |
| Сила борошна (W), о.а.  | 260      | 293  | 233  |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл  | 1070     | 1030 | 1030 |
| Стійкість до вилягання, бал   | 8        | 8    | 8    |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість до посухи, бал  | 8        | 8    | 8    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал   | 8        | 9    | 8    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість проти мухи шведської, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал  | 8        | 8    | 9    |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 8        | 8    | 8    |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал     |          | 6,5  |      |
| Блок  | 1        | 1    | 1    |
| Напрямок використання   | цїн      | слн  | ф    |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.