

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17013007 Назва сорту: Лікамеро **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	нешільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	біле	1
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	довгий	7
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,68	3,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,93	4,27	3,86
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,61	0,59	0,33
+,- до усередненої урожайності, %	26,2	16	9,2
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	90	90	90
Висота рослини, см	62,8	76,9	71,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	34,1	38,6	37,5
Вміст білка, %	13,9	14	13,9
Вміст сирової клейковини, %	27,6	28,1	27,9
Сила борошна (W), о.а.	294	313	324
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1110	1110	1000
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	слн	слн	слн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.