

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 16539001 Назва сорту: Аттергауер Дінкель **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габтус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	висока	7
10	Соломина: виловлення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виловлена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	нештальній	3
13	Колос: за довжиною (без остюків із зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	короткі	3
16	Колос: забарвлення	червоне	4
17	Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1
24	Зернівка: забарвлення	червоне	3
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягнення зерна	ознака не визначається	0
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилігання	ознака не визначається	0
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,37	5,97	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,77	5,12	
+ - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,85	
+ - до усередненої урожайності, %	9,15	-14,24	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,44	
Тривалість періоду вегетації, діб	267	254	
Висота рослини, см	72,7	73,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,7	45,5	
Вміст білка, %	12,1	12,5	
Стійкість до вилігання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнристої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,0	5,0	
Блок	1	1	
Напрям використання	X	X	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.