

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045040 Назва сорту: Віолетта Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191335

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	18,6	22,4	19,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,1	1,0	0,7
Урожайність, ц/га	14,2	25,9	19,5
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-4,4	3,5	0,4
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-23,5	15,6	2,1
Тривалість періоду вегетації, днів	107	102	121
Маса 1000 насінин, г	139,2	162,9	156,7
Висота рослини, см	60,1	76,2	85,5
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,9	10,1	15,8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,8	40,5	37,1
Вміст олії, %	24,5	23,0	24,2
Якість	вл	вл	вл
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.