

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045049 Назва сорту: ЕС ГОВЕРНОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200198

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,87	3,24	2,86
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,19	0,95	0,98
+,- до усередненої урожайності, %	11,4	41,3	51,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	104	104	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,2	196,6	187,6
Висота рослини, см	60	60,5	80,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	10,4	13,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,8	39,9	35,7
Вміст олії, %	24,2	22	23,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**