

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045050 Назва сорту: ЕС ДИРЕКТОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200199

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,57	3,34	3,06
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,11	1,05	1,18
+/- до усередненої урожайності, %	-6,4	45,7	63
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	105	105	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	139,3	186,5	178,7
Висота рослини, см	59,9	71,1	95,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	12,1	14,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	37,2	40,6	36,3
Вміст олії, %	23,5	21	22,5
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.