

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045033 Назва сорту: CBX15T1C1 Заявник (код): 2061 Власник сорту (код): 2061

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200194

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,86	3,44	3,43
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,27	1,12	1,35
+,- до усередненої урожайності, %	17,1	48,2	65,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	119	117	128
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	143,6	186,9	189,3
Висота рослини, см	73,4	77,8	88,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	11,3	13,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,3	38,1	33,9
Вміст олії, %	23,9	22,3	24,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.