

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045039 Назва сорту: CBX16T00C2 Заявник (код): 2061 Власник сорту (код): 2061**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200197**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,75	3,25	2,89
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,07	0,96	1,01
+,- до усередненої урожайності, %	4,4	41,9	53,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	103	104	109
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148,5	188,2	183,6
Висота рослини, см	62,1	70,2	88
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	11,7	12,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	36,6	41	36,7
Вміст олії, %	24,4	21,4	23,4
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**