

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045032 Назва сорту:** Тала **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200193**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,63	3,04	2,84
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,04	0,72	0,76
+,- до усередненої урожайності, %	2,6	30,9	36,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	123	117	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144	206,4	201
Висота рослини, см	74,5	83,7	95
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,3	13,4	17
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,7	39,3	34,2
Вміст олії, %	22,7	22	23,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.