

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 17017001 Назва сорту: Морячок Заявник (код): 1715 Власник сорту (код): 1715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200100

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
11	Листок: форма язичка	подвійна	3
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3
17	Рослина: габітус	прямий	1
18	Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	слабке	3
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
25	Стебло: за товщиною	середнє	5
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоті)	середнє	5
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5
32	Волоть: остюки	наявні	9
33	Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)	світло-золотисте	1
34	Волоть: розташування остюків	за всією довжиною	5
35	Волоть: найдовші остюки за довжиною	дуже короткі	1
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	біле	1
38	Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)	світло-золотисте	1
39	Волоть: положення відносно стебла	пряме	1
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0
42	Волоть: положення гілок	напівпряме	3
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7
44	Час достигання	середній	5
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1
47	Нижня колоскова луска: орнаментация	відсутня	1
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	слабке	3
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3
52	Колоскова луска: забарвлення	солон'яне	1
53	Зернівка: маса 1000 шт.	середня	5
54	Зернівка: за довжиною	середня	5
55	Зернівка: за шириною	середня	5
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0
58	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
61	Обрушена зернівка: забарвлення	червоне	6
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0
63	Ендосперм: за вмістом амілози	ознака не визначалася	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 9. Маса 1000 зерен, г – 28,4. Вегетаційний період, діб – 122. Плівковість, % – 20,8. Склоподібність, % – 100. Вихід крупи, % – 65,8; цілого ядра, % – 93,8. Група стиглості – 3. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8; фузаріоз, аскохітоз, гельмінтоспоріоз – 9.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.