

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor L.*

Заявка № 16018011 Назва сорту: КВС ФОБОС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191330

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлене, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опущення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	довга	7
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нешільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	тъяно-жовте	1
21	Рослина: за висотою (за досягнання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягнання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за ширину пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: глохчи за довжиною (у середині третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягнання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягнання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягнання	блідо-жовте	2
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягнання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягнання	біле	1
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	45,5	56,0	-
Тривалість періоду вегетації, діб	118	136	-
Маса 1000 зерен, г	26,4	24,3	-
Висота рослин, см	105	136	-
Стійкість до вилягання, бал	9	9	-
Стійкість до осипання, бал	8	8	-
Стійкість до посухи, бал	9	9	-
Стійкість до сажки пухирчастої, бал	9	9	-
Стійкість до гельмінтоспорозу, бал	9	9	-
Стійкість до кукурудзяного метелика, бал	9	9	-
Вміст крохмалю, %	75,0	77,4	-
Вміст сирого протеїну, %	10,9	9,2	-
Напрям використання: зерновий			
Блок: середньостиглий			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.