

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 11004138 Назва сорту:** П7535 **Заявник (код):** 1690 **Власник сорту (код):** 1690

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 15.01.2018 **Патент № 180102**

**Дата пріоритету:** 24.12.2014

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.04.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 150807**

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення                 | Код |
|------|--|----------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | сильне                     | 7   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                    | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                    | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластиинки  | помірна                    | 2   |
| 5    | Листок: кут між листковою пластиинкою і стеблом  | середній                   | 5   |
| 6    | Листок: положення пластиинки у просторі  | помірно похиле             | 5   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | слабка                     | 2   |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | ранній                     | 3   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски  | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи  | слабке                     | 3   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пляків   | помірне                    | 5   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками  | середній                   | 5   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі  | пряме                      | 1   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок   | мала                       | 3   |
| 15   | Качан: час появи шовку   | від раннього до середнього | 4   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | помірне                    | 5   |
| 18   | Волоть: розташування колосків за щільністю   | середньої щільності        | 5   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                    | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)   | коротка                    | 3   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | середня                    | 5   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною  | ознака не визначається     | 0   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга                      | 7   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріplення верхнього качана до висоти рослини   | середнє                    | 5   |
| 26   | Листок: пластиинка за ширину   | вузька                     | 3   |
| 27   | Качан: нижка за довжиною   | середня                    | 5   |
| 28   | Качан: за довжиною   | короткий                   | 3   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | середній                   | 5   |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична        | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | мала                       | 3   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен  | ознака не визначається     | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається     | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається     | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки  | зубовидний                 | 5   |
| 37   | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок  | ознака не визначається     | 0   |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки   | жовте                      | 3   |
| 39   | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок   | жовто-оранжеве             | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається     | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | помірне                    | 5   |

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник   | Значення |      |      |
|--|----------|------|------|
|  | С        | Л    | П    |
| Урожайність, ц/га                                    | 39,3     | 69,7 | 72,2 |
| Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га | -3,6     | -1,2 | -1,2 |
| Гарантована різниця до національного стандарту, %    | -8,4     | -1,7 | -1,6 |
| Днів до досягнення                                   | 99       | 108  | 125  |
| Збиральна вологість зерна, %                         | 14,8     | 20,3 | 21,3 |
| Збиральна вологість зерна національного стандарту, % | 18,5     | 21,9 | 22,3 |
| Вихід зерна при обмолоті, %                          | 84       | 78   | 81   |
| Стійкість до, бал                                    |          |      |      |
| посухи   | 8        | 8    | 9    |
| полягання  | 9        | 9    | 9    |
| пухирчастої сажки                                    | 9        | 9    | 9    |
| Вміст, %   |          |      |      |
| білка  | 9,8      | 9,2  | 9,1  |
| крохмалю   | 73,5     | 72,8 | 73,3 |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**