

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 16041001 Назва сорту:** Клеопатра **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191245****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за ширину	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	1,7	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,84	1,82	
+ - до усередненої урожайності, т/га	-0,17	0,12	
+ - до усередненої урожайності, %	-8,6	6,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	
Тривалість періоду вегетації, діб	97	101	
Висота рослини, см	100,1	102,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	4,4	
Вміст білка, %	23,4	23	
Вміст олії, %	43,1	45	
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	7	7	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	8	
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	
Блок	1	1	
Напрям використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.