

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 17088003 Назва сорту:** Джолі **Заявник (код):** 738 2600 **Власник сорту (код):** 738 2600**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.07.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191037****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: розмір | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: форма | конічна | 3 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | слабка | 3 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | відсутнє або дуже мале | 1 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | слабке | 3 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 |
| 7 | Світловий паросток: форма верхівки | закрита | 1 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | слабке | 3 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | слабке | 3 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | середня кількість | 5 |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною | короткі | 3 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | проміжний | 2 |
| 13 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | слабке | 3 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: за відкритістю | проміжний | 3 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 |
| 18 | Листок: зелене забарвлення | помірне | 5 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | слабке | 3 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір | малий | 3 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за ширину | вузькі | 3 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення | середньо | 5 |
| 23 | Листочек: хвильистість краю | помірна | 5 |
| 24 | Листочек: загиблення жилок | середнє | 5 |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку | помірно глянсуватий | 5 |
| 26 | Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки | наявне | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 28 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння | обрідне | 3 |
| 30 | Суцвіття: розмір | середній | 5 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку | відсутнє або дуже слабка | 1 |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | відсутнє або мале | 1 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | відсутнє або дуже мале | 1 |
| 36 | Рослина: час достигання | середній | 5 |
| 37 | Бульба: форма | короткоovalна | 2 |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною | мілкі | 3 |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки | жовте | 2 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | біле | 1 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | слабке | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|---------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 203,6 | 164,6 | |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 14,8 | 6,0 | |
| Урожайність, ц/га | 257,0 | 228,0 | |
| +/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 53,4 | 63,4 | |
| +/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, % | 26 | 38 | |
| Вміст крохмалю, % | 13,6 | 13,3 | |
| Збір крохмалю, ц/га | 34,9 | 30,3 | |
| Вміст сухої речовини, % | 21,1 | 20,5 | |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 109 | 100 | |
| Середня маса товарної бульби, г | 191,4 | 96,0 | |
| Товарність бульб, % | 73,6 | 74,0 | |
| Лежкість, бал | 5 | 9 | |
| Дегустаційна оцінка, бал | 6 | 9 | |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку | Стійкий | Стійкий | |
| Стійкість проти макроспоріозу, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти фітофторозу, бал | 9 | 9 | |
| Напрям використання | стл | стл | |
| Якість | скр | скр | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.