

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 16088005 Назва сорту: Сагіта Заявник (код): 738 Власник сорту (код): 738

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191036

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опущення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опущення верхівки	мало	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	короткі	3
11	Світловий паросток: бічні лагони за довжиною	листковий	3
12	Рослина: тип розвитку	розлогий	7
13	Рослина: габітус	помірне	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	малий	3
15	Листок: загальний розмір	відкритий	5
16	Листок: за відкритістю	слабке	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	темне	7
18	Листок: зелене забарвлення	слабке	3
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	малий	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	вузькі	3
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середньо	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	слабка	3
23	Листочек: хвилястість краю	мілке	3
24	Листочек: заглиблення жилок	не глянсуватий	3
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	наявне	9
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	слабке	3
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середня	5
28	Рослина: за висотою	рясне	7
29	Рослина: рясність цвітіння	середній	5
30	Суцвіття: розмір	слабке	3
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	середній	5
32	Віночок квітки: розмір	слабка	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	мале	3
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середній	5
36	Рослина: час досягнення	видовжена	5
37	Бульба: форма	мілкі	3
38	Бульба: вічка за глибиною	жовте	2
39	Бульба: забарвлення шкірки	біле	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	кремове	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла		

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	203,6	164,6	
Довірчий інтервал, ц/га (\pm)	14,8	6,0	
Урожайність, ц/га	260,8	218,0	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	57,2	53,4	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	28	32	
Вміст крохмалю, %	16,1	14,5	
Збір крохмалю, ц/га	42,0	31,6	
Вміст сухої речовини, %	24,1	22,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	105	104	
Середня маса товарної бульби, г	124,5	90,1	
Товарність бульб, %	76,9	75,1	
Лежкість, бал	6	9	
Дегустаційна оцінка, бал	7	9	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	9	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	пкр	скр	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.