

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 16088003 Назва сорту:** Таурас **Заявник (код):** 738 **Власник сорту (код):** 738**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.07.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191035****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3
24	Листочек: загиблення жилок	глибоке	7
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час достигання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	203,6	164,6	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	14,8	6,0	
Урожайність, ц/га	248,8	183,0	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	45,2	18,4	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	22	11	
Вміст крохмалю, %	17,8	17,4	
Збір крохмалю, ц/га	44,3	31,8	
Вміст сухої речовини, %	26,7	25,8	
Тривалість періоду вегетації, діб	100	106	
Середня маса товарної бульби, г	102,3	83,3	
Товарність бульб, %	63,8	70,6	
Лежкість, бал	7	9	
Дегустаційна оцінка, бал	9	9	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	9	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	пкр	пкр	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.