

Вид: Костриця овеця *Festuca ovina* L.

Заявка № 16473002 Назва сорту: Думас 1 **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------------------|-----|
| 1 | Рослина: плоїдність | гексаплоїд | 6 |
| 2 | Піхва листка: антоціанове забарвлення (влітку в рік сібви) | слабке | 3 |
| 3 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 4 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 |
| 5 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 6 | Лише для сортів костриці червоної. Листок: за ширину | ознака не визначається | 0 |
| 7 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | темне | 7 |
| 8 | Листок: сизий наліт | наявний | 9 |
| 9 | Рослина: формування кореневища | відсутнє або слабке (мало помітне) | 1 |
| 10 | Рослина: час виявлення суцвіття | середній | 5 |
| 11 | Рослина: за висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують) | середня | 5 |
| 12 | Прапорцевий листок: за довжиною | середній | 5 |
| 13 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за ширину | ознака не визначається | 0 |
| 14 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина | ознака не визначається | 0 |
| 15 | Рослина: за довжиною найдовшого стебла (суцвіття включено; наприкінці цвітіння) | середнє | 5 |
| 16 | Рослина: довжина верхнього міжвузля | середнє | 5 |
| 17 | Суцвіття: за довжиною | середнє | 5 |
| 18 | Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті | слабке | 3 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,12. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 4. Вміст у сухій речовині білка, % – 14; клітковини, % – 38. Висота рослин, см – 60.Період від сходів (весняного відростання) до збиральної стигlosti, діб – 95. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 0,55. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти борошнистої роси, бал (1–9) – 7; сажки, бал (1–9) – 7; стеблової іржі, бал (1–9) – 6; антракнозу, бал (1–9) – 7; снігової плісняви, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.