

Вид: Костриця червона *Festuca rubra* L.

Заявка № 18377003 Назва сорту: ГРИНМІЛ **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191043

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|---------------------|-----|
| 1 | Рослина: плоідність | гексаплоїд | 6 |
| 2 | Піхва листка: антоціанове забарвлення | помірне | 5 |
| 3 | Рослина: за природною висотою | середня | 5 |
| 4 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 7 |
| 5 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 6 | Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною | середній | 5 |
| 7 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 8 | Листок: сизий наліт | відсутній | 1 |
| 9 | Рослина: формування кореневища | відсутнє або слабке | 1 |
| 10 | Рослина: час появи суцвіття | середній | 5 |
| 11 | Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують) | середня | 5 |
| 12 | Прапорцевий листок: за довжиною | середній | 5 |
| 13 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною | середній | 5 |
| 14 | Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина | середнє | 5 |
| 15 | Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно) | середнє | 5 |
| 16 | Рослина: верхнє міжвузля за довжиною | довге | 7 |
| 17 | Суцвіття: за довжиною | середнє | 5 |
| 18 | Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті | помірне | 5 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,15. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,5. Вміст білка у сухій речовині, % – 13; клітковини, % – 27. Висота рослин, см – 85. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 70. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 0,98. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; сажка – 7; стеблова іржа – 8; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.