

**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

**Заявка № 15364003 Назва сорту:** Луїза **Заявник (код):** 1698 **Власник сорту (код):** 1698

**Дата пріоритету:** 25.11.2015

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191135**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожай насіння (за 14% вологості), т/га – 0,55. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 81,0/16,8. Вміст білка, % – 20,9; клітковини, % – 25,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; пероноспороз – 7; іржа – 7; чорна плямистість стебел – 9; аскохітоз – 7; бура плямистість – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**