

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 17122003 Назва сорту: Маноло **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	відсутні або дуже слабке	1
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 85 т/га. Маса товарного коренеплоду – 210 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 130 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 12,8%; загального цукру – 8,3%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.