

Вид: Капуста колърабі *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.

Заявка № 18098001 Назва сорту: Лех **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191030

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	ознака не визначалась	0
3	Черешок: перехрещування	відсутнє	1
4	Черешок: за довжиною	середній	5
5	Черешок: за товщиною	середній	5
6	Черешок: за положенням у просторі	похилий	3
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	відсутні або дуже мало	1
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	середня кількість	5
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	мілка	3
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плеската	2
15	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
16	Листкова пластинка: восковість	сильна	7
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	2
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	ознака не визначалась	0
20	Стеблоплід: колір шкірки	біло-зелений	1
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	поперечно-еліптична	2
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5
23	Рослина: початок збиральної стигlosti	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 75. Лежкість, балів (1–9) – 5. Вміст вітаміну С, мг % – 75; загального цукру, % – 2,7; сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 3; бактеріоз судинний – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.