

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 17101003 Назва сорту: Аквата **Заявник (код):** 2015 **Власник сорту (код):** 2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191032

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	сильне	7
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7
27	Скоростиглість: за літнього садіння	від середнього до пізнього осіннього типу	6
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 26. Товарна врожайність, т/га – 25,2. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 110. Період плодоношення, діб – 18. Вміст білка, % – 2,3; вітаміну С, мг % – 125; загального цукру, % – 4,28; сухої речовини, % – 12,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.