

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101001 Назва сорту: Ількар **Заявник (код):** 1650 **Власник сорту (код):** 1650

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191034

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	пряме	1
5	Листок: за довжиною	довгий	7
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	зелене	1
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	3
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	покрита	3
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	1
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	дуже рання	1
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 26. Товарна врожайність, т/га – 25. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 20. Вміст білка, % – 2,5; вітаміну С, мг % – 122; загального цукру, % – 3,8; сухої речовини, % – 13,1. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.