

Вид: Морква *Daucus carota L.***Заявка № 17109008 Назва сорту:** Новара **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200084****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: розетка за ширину	вузька	3
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
4	Листок: розсичність	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за ширину	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3
12	Коренеплід: форма плача	плескаті	1
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плача	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плача	середня	5
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильна	7
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3
26	Коренеплід: надземна частина	середня	5
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові піляки	2

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 85 т/га. Тривалість періоду до досягнення – 130 діб; вміст сухої речовини – 6%; загально-го цукру – 5,4%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.