

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 18110008 Назва сорту: Северін **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191145

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	гостра	1
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	великий	7
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	помірно стійкий	2
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	наявна	9
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 230. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 120. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): *Cucumis Mosaic Virus* – 8. Заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.