

Вид: Помідор юстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115026 Назва сорту: ДРЦ 564 Заявник (код): 2522 Власник сорту (код): 744

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індегерміантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індегерміантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 сучвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	короткий	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Сучвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка сучвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	дуже тонкий	1
33	Плід: кількість настінніх камер	тильки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плача (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плача (перед достиганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плача) (перед достиганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за достиганням)	червоне	5
39	Плід: забарвлення мякоті (за достиганням)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час достигання	дуже ранній	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за достиганням)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Ryzenochæta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium spp.</i>	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індегерміантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досягненням)	відсутні	1
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебаувлений	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 300. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 8; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 5. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 22. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 76. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.