

**Вид:** Помідор юстівний *Solanum lycopersicum* L.

**Заявка № 18115025 Назва сорту:** Куртіно **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191167**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індегерміантний	2
3	Лише дегерміантні сорти. Рослина: кількість міжузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індегерміантні сорти. Стебло: міжузля за довжиною менш 114 см	коротке	3
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розщепленістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	ознака не визначалась	0
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	ознака не визначалась	0
18	Квітка: опушення приймочки маточки	ознака не визначалась	0
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	малий	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	ознака не визначається	0
38	Плід: забарвлення (за достиганням)	червоне	5
39	Плід: забарвлення мякоті (за достиганням)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час достигання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloïdogynus incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48.1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicans lycopersici</i>	наявна	9
50.1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50.2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50.3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51.2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenophaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	ознака не визначалась	0
62	Лиш індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 420. Вміст каротину, мг% – 62; сухої речовини в плоді, % – 6,5; вітаміну С, мг% – 20; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,45. Маса товарного плоду, г – 44. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 80. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.