

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 18120017 Назва сорту: Кодекс Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191254

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1  | Насінина: забарвлення  | чорне                    | 3   |
| 2  | Сіянець: антоціанове забарвлення   | наявне                   | 9   |
| 3  | Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)   | ознака не визначалась    | 0   |
| 4  | Сіянець: форма сім'ядолей  | ознака не визначалась    | 0   |
| 5  | Листок: положення у стадії 10–12 листків   | напівпряме               | 3   |
| 6  | Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)  | розчленована             | 3   |
| 7  | Рослина: діаметр   | малий                    | 3   |
| 8  | Рослина: утворення головки   | не утворює               | 1   |
| 9  | Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків   | ознака не визначається   | 0   |
| 10 | Головка: за щільністю  | ознака не визначається   | 0   |
| 11 | Головка: розмір  | ознака не визначається   | 0   |
| 12 | Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи   | ознака не визначається   | 0   |
| 13 | Головка: форма позовжнього розрізу   | ознака не визначається   | 0   |
| 14 | Листок: за товщиною  | тонкий                   | 3   |
| 15 | Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів) | напівпряме               | 3   |
| 16 | Листок: форма  | оберненояцеподібна       | 7   |
| 17 | Листок: форма верхівки   | округла                  | 3   |
| 18 | Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків  | червонуватий             | 4   |
| 19 | Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків  | дуже сильна              | 9   |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення  | наявне                   | 9   |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення  | дуже сильна              | 9   |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення  | суцільне                 | 2   |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення  | дифузне і плямами        | 3   |
| 24 | Листок: глясуватість верхнього боку  | сильна                   | 7   |
| 25 | Листок: пухирчастість  | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 26 | Листок: розмір пухирів   | ознака не визначається   | 0   |
| 27 | Листкова пластинка: хвилястість краю   | сильна                   | 7   |
| 28 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки   | наявна                   | 9   |
| 29 | Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною   | помірна                  | 5   |
| 30 | Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки   | помірна                  | 5   |
| 31 | Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості   | ознака не визначається   | 0   |
| 32 | Листкова пластинка: жилкування   | віялоподібне             | 2   |
| 33 | Пазушне жилкування   | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 34 | Час збиральної стиглості   | середній                 | 5   |
| 35 | Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня  | дуже пізній              | 9   |
| 36 | Рослина: за висотою (квітуча рослина)  | ознака не визначалась    | 0   |
| 37 | Рослина: фасціація (під час цвітіння)  | наявна                   | 9   |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)   | дуже слабка              | 1   |
| 39 | Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) I isolate B1:16  | наявна                   | 9   |
| 40 | Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1   | наявна                   | 9   |
| 41 | Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )   | ознака не визначалась    | 0   |
| 42 | Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>   | ознака не визначалась    | 0   |

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 30,1. Тривалість періоду до досягання, діб – 53. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 8; септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.