

**Вид:** Салат посівний листковий *Lactuca sativa L. var. secalina*

**Заявка № 18120014 Назва сорту:** Солос **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191251**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти з закритою головкою. Головка: перекріття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральної стигlostі (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	дуже сильна	9
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвильистість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибину	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	сильна	7
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стигlostі	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 15. Тривалість періоду до досягнення, діб – 52. Стійкість до хвороб, балів (1–9): не-справжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 9; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.