

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa L. var. longifolia*

Заявка № 18546005 Назва сорту: Веродіта

Заявник (код): 1730

Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191258

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насініна: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти з закритою головкою. Головка: перекріття верхньої частини листків	сильне	7
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральної стигlostі (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів	пряме	1
16	Листок: форма	оберненояйцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвильистість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне гілкування	слабке	3
34	Час збиральної стигlostі	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконосів в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25,8. Середня маса плоду, г – 397. Щільність головки, балів – 5,5. Тривалість періоду до досягнення, діб – 57. Лежкість, % – 86. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; антракноз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.