

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

Заявка № 18546003 Назва сорту: Мунред **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	середньої щільності	5
11	Головка: розмір	малий	3
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	2
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	еліптична	2
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	дуже сильна	9
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	сильна	7
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	відсутня	1
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприйнятливий (відсутня)	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 30. Середня маса плоду, г – 310. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, дб – 44. Лежкість, % – 80. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.