

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 16284004 Назва сорту: ГЕТЬМАН **Заявник (код):** 1601 1940 **Власник сорту (код):** 1601 1940

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.08.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	дуже сильне	9
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	переважно на кінцях довгих пагонів, що відходять від дворічних чи старших гілок (плодоношення купками у вузлах)	2
5	Однорічний пагін: забарвлення	чорнувате	4
6	Листок: форма бічних листочків	вузькоеліптична	3
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	велика	7
8	Горіх: розмір	дуже великий	9
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шва)	яйцеподібна	4
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	загострена	1
15	Горіх: виступ апікального кінчика	сильний	7
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	вузьке	3
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	глибока	7
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	сильно борозенчаста	3
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3
26	Ядро: розмір	середній	5
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	середній	5
29	Час початку листопаду	середній	5
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2
31	Оплодень: стійкість до опадання	повністю стійкий	3
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від середнього до пізнього	6
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від середнього до пізнього	6
34	Час цвітіння жіночих квіток	від середнього до пізнього	6
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 7,2. Середній урожай з дерева, кг – 72,0. Середня маса плоду, г – 20,2. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 154. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 5. Вихід ядра, % – 51,1. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 7. Вміст жиру, % – 65,4; білка, % – 14,5; вуглеводів, % – 11,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9; горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – не визначалась; чорна плямистість – 8. Група досягання - сс.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.