

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009182 Назва сорту: ДБ Варта Заявник (код): 2260 2031 Власник сорту (код): 2260 2031

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200275

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|---|-------------------------------|-----|------------------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | сильне | 7 | |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 2 | |
| 4 | Листок: хвилястість краю пластинки | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом | середній | 5 | |
| 6 | Листок: положення пластинки у просторі | ледь похиле | 3 | |
| 7 | Стебло: зигзагоподібність | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 8 | Волоть: час цвітіння | від дуже раннього до раннього | 2 | |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 11 | Волоть: антоціанове забарвлення пилляків | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками | середній | 5 | |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочек у просторі | ледь похиле | 3 | |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочек | мала | 3 | |
| 15 | Качан: час появи шовку | від дуже раннього до раннього | 2 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | помірне | 5 | |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | помірне | 5 | |
| 18 | Волоть: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 21 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | |
| 22 | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | коротка | 3 | |
| 23 | Волоть: бічна гілочка за довжиною | середня | 5 | |
| 24,1 | Лише для інбридерів! сортів з цукровим або розлускним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга | 7 | |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | середнє | 5 | |
| 26 | Листок: пластинка за ширину | середня | 5 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | середня | 5 | |
| 28 | Качан: за довжиною | середній | 5 | |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | великий | 7 | до дуже великого |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | середня | 5 | |
| 32 | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидний | 5 | |
| 37 | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовте | 3 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок | жовте | 3 | |
| 40 | Лише для сортів з розлускним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | відсутнє або дуже слабке | 1 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,14 | 7,75 | 7,52 |
| урожайність (за стандартною вологості 14%), т/га | 5,71 | 9,62 | 6,74 |
| +/- до усередненої урожайності, т/га | 0,57 | 1,87 | -0,78 |
| +/- до усередненої урожайності, % | 11,1 | 24,1 | -10,3 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 112 | 114 | 114 |
| Висота рослини, см | 205,2 | 237,1 | 215,6 |
| Вихід зерна, % | 84,8 | 79,7 | 83,2 |
| Висота прикріплення качана, см | 70,2 | 82,6 | 74,2 |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, % | 14,6 | 34,1 | 4,4 |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
| Вміст білка, % | 7,5 | 7,9 | 7,9 |
| Вміст крохмалю, % | 73,3 | 72,7 | 73,2 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 9 | 8 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти стеблевої гнилі, бал | 0 | 9 | 9 |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал | 9 | 9 | 8 |
| Група стиглості (ФАО) | 2 | 2 | 2 |
| Напрям використання | | | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.