

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 15009145 Назва сорту:** ЗПСК 388 **Заявник (код):** 1994 **Власник сорту (код):** 1994

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.03.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200234**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвильистість краю пластиинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластиинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластиинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутні або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	відсутнє або дуже слабке	1	дуже слабке
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від серединного до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільної
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплennя верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластиинка за ширину	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жово-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жово-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,4	10,46	6,79
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,06	2,45	0,17
+/- до усередненої урожайності, %	1,1	30,6	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	122	124	121
Висота рослини, см	209,9	245,2	224,7
Вихід зерна, %	77,2	76	80,4
Висота прикріплennя качана, см	77,8	82,5	86,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29	23,1	1,7
Вирівняність за висотою прикріплennя нижнього качана, см	5,1	5,4	4,6
Вміст білка, %	8,7	8,6	8,2
Вміст крохмалю, %	72,7	72,6	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання			зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**