

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 14040047 Назва сорту: Редстоун **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.08.2018 **Патент № 180947**

Дата пріоритету: 04.12.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,7	32,1	24,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,6	0,4
Урожайність, ц/га	18,5	37,5	28,9
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-1,2	5,4	4,8
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-6,1	16,8	19,9
Висота рослин, см	121	128	119
Днів до досягання	288	312	300
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Зимостійкість, бал	7	8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	8	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїда, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти переноспорозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	20,9	19,4	17,0
Вміст олії, %	45,4	46,9	49,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,2
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.