

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045015 Назва сорту: Віста **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200457

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,62	3,05	3,13
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,03	0,73	1,05
+,- до усередненої урожайності, %	1,7	31,4	50,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	118	107	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	139,8	188,6	182,7
Висота рослини, см	70,3	70,9	82,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	10,8	14,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	35,1	39,8	35,9
Вміст олії, %	24,3	21,5	23,2
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.